




Ich verspreche Ihnen eine Untersuchung von höchster Qualität, Sicherheit, Hygiene und Patienten-Komfort. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Prof. Dr. med. H. Kramer



End- und Dickdarmzentrum

### Magen-Darm Praxis - Prof. Dr. med. H. Kramer

am End- und Dickdarmzentrum Mannheim

Endoskopie – Gastroenterologie – Proktologie – Ernährungsmedizin

Bismarckplatz 1 (am Hbf.) \* D- 68165 Mannheim

Tel.: 0621 / 401011 \* Fax: 0621 / 401012

info@magendarm-zentrum.de \* www.magendarm-zentrum.de

## Praxis Prof. Dr. Kramer & Kollegen

Gastroenterologie & Ernährungsmedizin  
am End-und Dickdarmzentrum Mannheim

# SANFTE VORBEREITUNG FÜR DIE KOLOSKOPIE

(sanfte Darmspiegelung)



Ihr Untersuchungstermin:

\_\_\_\_\_, der \_\_\_\_\_

Uhrzeit: \_\_\_\_\_



## MOVIPREP



EIN GUT GEREINIGTER DARM IST IHR BEITRAG FÜR EINE ANGENEHME UND ERFOLGREICHE UNTERSUCHUNG!

### AM TAG VOR DER UNTERSUCHUNG:

- Um ca. 15 Uhr nehmen Sie die 2 Abführ-Tabletten ein
- Bis 14 Uhr nur flüssige oder breiige Kost essen (z.B. Wasser, Kaffee, Quark, Pudding, Yoghurt)
- Um ca. 18 Uhr trinken Sie den ersten Liter MOVIPREP® innerhalb von 1- 2 Stunden. Dazu füllen Sie Beutel A und Beutel B in 1 Liter Wasser und verrühren alles gut. Versuchen Sie, alle 10- 15 Minuten ein Glas zu trinken.  
Leicht gekühlt kann die Trinklösung bekömmlicher sein. Anschließend trinken Sie bitte ca. 1 Liter frei gewählte, klare Flüssigkeit (Wasser, Tee, klare Säfte, Soft Drinks).

### AM TAG DER UNTERSUCHUNG:

- Heute trinken Sie den 2. Liter MOVIPREP®. Auch hier werden wieder Beutel A und Beutel B in 1 Liter Wasser aufgelöst und verrührt. Drei Stunden vor Untersuchungsbeginn (Ihrem Termin) muss MOVIPREP® vollständig eingenommen sein!
- Anschließend trinken Sie bitte ca. 1 Liter frei gewählte, klare Flüssigkeit (Wasser, Tee, klare Säfte, Soft Drinks).
- Am Ende muss leicht gelbliche Flüssigkeit ohne Rückstände ausgeschieden werden.
- Zwei Stunden vor der Untersuchung sollte nichts mehr getrunken werden.

Bitte bringen Sie zur Untersuchung einen Bademantel oder ein großes Handtuch mit.

Medikamente können in der Regel wie bisher eingenommen werden. Informieren Sie uns aber, ob Sie Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen, da diese in der Regel nach Absprache mit Ihrem Hausarzt oder uns rechtzeitig abgesetzt werden.

Manchmal kann es durch das Abführen zu einer harmlosen Hautreizung am After kommen. Das Auftragen einer Hautschutzcreme hilft dann effektiv.

Im Falle, dass Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns unbedingt spätestens 48 Stunden vor der Untersuchung. Ansonsten entstehen Ihnen unnötige Kosten und für andere Patienten Wartezeiten.

Sanfte Koloskopie:

- Darmreinigung mit nur zwei Litern MOVIPREP®
- Propofol Narkose/ Sedierung
- Hochauflösende Videoendoskopie (Olympus) mit sterilem Einwegmaterial
- CO<sub>2</sub>- Insufflations- Endoskopie